


## Timing en doseringen

### VRUCHT- GROENTEN (onbedekte teelt van Cucurbitaceae)

Gebaseerd op internationale  
ervaringen. We hebben nog  
geen ervaring in Nederland



Periode / BBCH	vóór zaai		10-13		22-29		50-51		na oogst
<i>penergetic b</i>	2 liter/ha*								2 liter/ha*
<i>penergetic p</i>			250 ml/ha		250 ml/ha		150 ml/ha		

Geldt voor toepassing in de onbedekte teelt van vruchtgroenten uit de Cucurbitaceae familie zoals pompoenachtigen

\* De dosering bedraagt het 1<sup>e</sup> jaar 2 l/ha. In de opvolgende jaren kan de dosering steeds met 0,5 l/ha worden afgebouwd tot uiteindelijk 0,5 l/ha in het 4<sup>e</sup> jaar.

## Timing en doseringen

### VRUCHT- GROENTEN

(bedekte substraatteelt van Cucurbitaceae en Solaniceae)

Gebaseerd op internationale ervaringen. We hebben nog geen ervaring in Nederland



Periode / BBCH		09-13	51	61		iedere 4 weken tot het einde van de teelt
<i>penergetic b</i>						
<i>penergetic p</i>		250 ml/ha	250 ml/ha	250 ml/ha		150 ml/ha

Geldt voor toepassing in de bedekte substraatteelt van bijv. tomaat, paprika, aubergine, courgette, komkommer, meloen, enz.

N.B. *penergetic p* kan als gewasbespuiting of via de druppelleiding worden toegepast.